Correction du Bac blanc

Commentaires	Corrigé rédigé
<p>Pas de droit à l'erreur dans une question du niveau de seconde...</p> <p>Pas de bluff en concluant sans rappeler le domaine des IR !</p> <p>La molécule n'est pas un acide carboxylique, même si le nom permettait le doute... regardez la formule !</p> <p>IL est demandé de justifier la multiplicité... ça peut se faire très rapidement !</p> <p>La formule pour les bases fortes doit être connue par cœur (comme pour les acides forts). Sinon redémontrez.</p> <p>Vous avez le choix entre plusieurs précautions mais il faut en citer au moins deux...</p> <p>Un schéma doit obéir à des règles précises vues depuis la seconde. Ne pas oublier le pHmètre et l'agitation, ainsi que le nom de la verrerie.</p>	<p>EXERCICE 1 : La molécule d'acide ascorbique</p> <p>1.1. La formule brute de l'acide ascorbique est $C_6H_8O_6$</p> <p>1.2 La longueur d'onde minimum correspond au nombre d'onde maximum donc :</p> $\lambda_{\min} = \frac{1}{\sigma_{\max}} = \frac{1}{4000} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 2,5 \mu\text{m}$ <p>La longueur d'onde est donc supérieur à $2,5 \mu\text{m}$ ce qui correspond bien à l'infra-rouge puisque l'infra-rouge commence à $0,8 \mu\text{m}$</p> <p>1.3 On trouve la bande correspondant au groupe alcool entre 3200 et 3700 cm^{-1} (même si la forme n'est pas habituelle mais composée de plusieurs pics) et la bande $C=O$ des esters vers 1700-1740 cm^{-1}</p> <p>1.4 La formule développée de l'acide ascorbique est :</p> <p>Il y a 7 groupes de protons équivalents repérés par des couleurs différentes :</p> <p>1.5. Les protons portés des groupes alcools donnent des singulets car portés par un oxygène. Les autres donnent $n+1$ pics lorsqu'ils ont n voisins. Au final : 1 quadruplet, 2 doublets et 4 singulets.</p> <p>2. Titrage pH-métrique</p> <p>2.1. La soude étant une base forte, alors $pH = pK_e + \log C_b$ où C_b est la concentration molaire de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc $pH = 14,0 + \log (1,00 \times 10^{-2}) = 12,0$ Ce pH étant élevé, il faut porter des lunettes et gants de protection (en plus de la blouse qui est obligatoire)</p> <p>2.2 Dispositif de titrage pH-métrique</p> <p>Burette graduée contenant une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$</p>

Attention : une des caractéristiques d'une réaction de dosage est d'être totale donc pas de double flèche

La résolution suivante n'est qu'une redite de tout ce qui a été fait en classe et en TP plusieurs fois...

Trouvez 2 sources d'erreur plausibles...

Question plus difficile car il fallait avoir l'idée de regarder le pH avant le dosage (qui correspond à V=0 sur la courbe)

Question très classique, que vous devez faire les yeux fermés !

3.2.1. Partie qui demande du recul sur les dosages
Pour bien comprendre pourquoi un volume équivalent faible ne va pas : une erreur de 0,1 mL relativement à $V_E = 15$ mL est faible, mais une même erreur de 0,1 mL relativement à $V_E = 1,5$ mL serait élevée).

2.3. L'équation de la réaction support de titrage est : $AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

2.4. Exploitation du dosage :

À l'équivalence, on a introduit autant de OH^- que d'acide AH initialement présent donc :

$$n(AH)_{titré} = C_b \cdot V_E$$

On détermine le volume à l'équivalence par la méthode des tangentes parallèles sur l'ANNEXE :

$$V_E = 13,6 \text{ mL}$$

Masse d'acide ascorbique dans la prise d'essai de $V_A = 10,0$ mL :
 $m(AH)_{titré} = C_b \cdot V_E \cdot M(C_6H_8O_6)$
 $= 1,00 \cdot 10^{-2} \cdot 13,6 \cdot 10^{-3} \cdot 176$
 $= 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ g} = 23,9 \text{ mg}$

Le comprimé a été dissous dans 200,0 mL d'eau distillée, et le prélèvement est de 10 mL.

Il y donc dans le comprimé :
 $m(AH)_{comprimé} = 20 \cdot 24 = 479 \text{ mg}$

2.5. La masse obtenue est proche de la valeur indiquée par le fabricant (500 mg).

$$\text{Calculons l'écart relatif : } \frac{|m(AH)_{titré} - m(AH)_{théorique}|}{m(AH)_{théorique}} = \frac{|479 - 500|}{500} = 4,2 \%$$

Étant inférieur à 5 %, cet écart relatif est acceptable.

Cependant, plusieurs sources d'erreurs sont possibles :

- Perte de solide lors du broyage dans le mortier et du transvasement dans la fiole jaugée,
- Trait de jauge des fioles jaugées (200,0 mL et 10,0 mL) mal repérés,
- Imprécision lors de la détermination du volume à l'équivalence par une méthode graphique.
- Incertitude sur la concentration C_b de la solution titrante,

2.6. Si l'acide ascorbique est un acide fort alors $pH = -\log C_A$ où C_A est la concentration apportée en acide ascorbique. Or la concentration apportée en acide ascorbique est :

$$C_A = \frac{n(AH)_{comprimé}}{V_S} = \frac{n(AH)_{titré}}{V_A} = \frac{C_b \cdot V_E}{V_A} \text{ soit } C_A = 13,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L qui conduit à } pH = -\log(13,6 \cdot 10^{-3}) = 1,87$$

À l'aide de la courbe du titrage, on lit pour $V = 0$, $pH = 3,0$.

Le pH expérimental (3,0) étant supérieur à la valeur théorique, l'acide ascorbique est donc un acide faible.

3. Autres méthodes de titrage.

3.1. Utilisation d'un indicateur coloré :

Un indicateur coloré est adapté à un titrage pH-métrique si le pH à l'équivalence est inclus dans sa zone de virage

Ici, $pH_E = 7,8$; on pourra utiliser le rouge de crésol qui virera du jaune (teinte acide au début du titrage car $pH < 7,2$) au rouge (teinte basique quand $pH > 8,8$).

3.2. Titrage conductimétrique :

V_E

3.2.1. D'après l'équation support du titrage, on a vu qu'à l'équivalence :

$$C'_A \cdot V'_A = C'_B \cdot V_E \text{ soit } V_E = \frac{C'_A \cdot V'_A}{C'_B} = \frac{6 \cdot 10^{-3} \cdot V'_A}{1,00 \cdot 10^{-1}} = 6 \cdot 10^{-2} \cdot V'_A$$

D'après la verrerie disponible, V'_A vaut au maximum 25,0 mL, alors on aurait

$$V_E = 6 \cdot 10^{-2} \cdot 25,0 = 1,5 \text{ mL.}$$

Ce volume équivalent n'est pas assez élevé, il conduirait à une erreur relative trop grande.

3.2.2. Afin d'obtenir un volume équivalent V_E plus élevé, il est nécessaire d'utiliser une solution d'hydroxyde de sodium moins concentrée. Par exemple dix fois moins concentrée ainsi $V_E = 15$ mL. (On peut aussi imaginer une dilution par 20)

Attention :
Ce n'est pas le protocole de la dilution qui est demandé...

Les parties nécessaires sont soulignées.

Protocole du titrage conductimétrique avec la solution de soude diluée 10 fois:

On prélève, à l'aide d'une pipette jaugée, 25,0 mL de la solution d'acide ascorbique.

On verse ces 25,0 mL dans un grand bécher puis on ajoute un important volume d'eau distillée. L'ensemble est placé sous agitation magnétique.

On place la cellule du conductimètre dans la solution d'acide ascorbique.

On met dans la burette, la solution d'hydroxyde de sodium diluée 10 fois ($c_B = 1,00 \times 10^2 \text{ mol.L}^{-1}$).

On verse mL par mL la solution titrante et on relève la valeur de la conductivité σ du mélange réactionnel.

On trace la courbe $\sigma = f(V)$, avec V volume de la solution d'hydroxyde de sodium.

On modélise les deux parties de la courbe par des fonctions affines.

On détermine le volume équivalent : c'est le volume correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux droites modélisées.

3.2.3. L'équation de la réaction support de titrage est : $\text{AH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{A}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

On rappelle que seuls les ions participent à la conductivité d'une solution.

En négligeant les effets de la dilution lors des ajouts de solution titrante :

Avant l'équivalence : À chaque fois qu'une molécule AH est consommée par un ion HO^- , un ion spectateur Na^+ est ajouté au milieu réactionnel et un ion A^- se forme.

La solution devient de plus en plus concentrée en ions, sa conductivité augmente.

On obtient une droite de pente positive.

Seule la courbe 1, présente une droite positive pour $V < V_E$.

La courbe 1 correspond à ce titrage.

Facultatif :

Au-delà de l'équivalence: Il n'y a plus de molécules AH. La concentration en ion HO^- et Na^+ augmente après chaque ajout (et celle de A^- ne varie pas) donc la conductivité augmente.

On obtient une droite de pente positive.

Cependant, avant l'équivalence, l'augmentation de conductivité est due à Na^+ et A^- tandis qu'après l'équivalence, l'augmentation de conductivité est due à Na^+ et HO^- .

Comme les ions OH^- conduisent mieux le courant que les ions A^- ($\lambda(\text{HO}^-) > \lambda(\text{A}^-)$), la pente de la droite est encore plus élevée. Ceci confirme le choix de la courbe 1.

EXERCICE 2 : Collision au LHC

1. À propos du boson de Higgs

1.1. L'observation du boson de Higgs complète la théorie du modèle standard en permettant de comprendre pourquoi les particules élémentaires ont une masse.

1.2. L'observation du boson de Higgs nous ramène dans un passé extrêmement lointain, autour de 10^{-10} s après le Big Bang, soit vers la naissance de l'Univers.

2. Apport de la relativité restreinte

2.1. $E_C = (\gamma - 1).m_p.c^2$ avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ Si $v \rightarrow c$ alors $\gamma \rightarrow \infty$ alors $E_C \rightarrow \infty$

2.2. Il faut vérifier que l'énergie cinétique est multiplié par 15 (ce qui est indiqué dans le document 3)

$$\frac{E_{c1}}{E_{c2}} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} - 1 \right) . m_p . c^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}} - 1 \right) . m_p . c^2} = \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0,999999991^2}} - 1 \right)}{\left(\frac{1}{\sqrt{1 - 0,999997828^2}} - 1 \right)} = 15,565$$

L'énergie cinétique d'un proton a été multipliée par 16, ce qui est cohérent avec le guide du LHC qui indique un facteur d'environ 15.

C'est une simple compréhension du document 1.

On peut aussi raisonner avec les valeurs numériques :
Il faut alors calculer $E_{c1} = 7 \text{ TeV}$
(ou $1,12 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ ou $7 \cdot 10^{12} \text{ eV}$)
et $E_{c0} = 7,19 \cdot 10^{-8} \text{ J}$

$$E_m = mc^2$$

$$E_c = 479mc^2$$

$$E_T = 480mc^2$$

Exploitation des documents...

Exploitation des documents et attention aux unités ;

Il est accepté des vitesses entre 100km/h et 500km/h pour le TGV...
Rq : Le maximum pour le TGV actuellement est 320 km/h...

Pas de justification notée ici

Concluez correctement

$$2.3. E_{\text{totale}} = E_c + E_m = (\gamma - 1)m_p c^2 + m_p c^2 = \gamma m_p c^2 - m_p c^2 + m_p c^2 = \gamma m_p c^2 = E_{\text{totale}}$$

Comme $E_c = (\gamma - 1)m_p c^2$ on peut considérer $E_{\text{totale}} = E_c$ si $\gamma - 1 = \gamma$ donc si γ est bien supérieur à 1 Calculons la valeur de γ avec les protons animés d'une vitesse v_0 (les plus lents, ainsi γ sera le plus faible).

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,999997828^2}} = 4,79794569 \times 10^2 \text{ soit environ } 480$$

On vérifie effectivement que $\gamma \gg 1$, donc l'énergie totale du proton est pratiquement égale à son énergie cinétique.

3. Manipulation à haute énergie

3.1. L'énergie de collision entre les deux protons est $E_{\text{collision}} = 2E_{cp}$

On utilise les données du document 3 : Les protons à pleine vitesse possèdent une énergie cinétique quinze fois supérieure à celle qu'ils ont au moment où ils pénètrent dans le LHC.

$$E_{cp} = 15 \times 450 \text{ GeV}$$

Donc $E_{\text{collision}} = 2 \times 15 \times 450 \text{ GeV} = 1,35 \times 10^4 \text{ GeV} = 13,5 \text{ TeV}$ et en ne conservant que deux chiffres significatifs, on vérifie bien que $E_{\text{collision}} = 14 \text{ TeV}$.

Autre méthode : On calcule l'énergie cinétique des protons les plus rapides, de vitesse v_1 :

$$E_{cp} = (\gamma - 1)m_p c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} - 1 \right) m_p c^2 = 1,120326 \times 10^{-6} \text{ J}$$

On stocke la valeur non arrondie en mémoire de la calculatrice.

$$E_{\text{collision}} = 2E_{cp}$$

$$E_{\text{collision}} = 2 \times 1,1203261 \times 10^{-6} = 2,240652 \times 10^{-6} \text{ J}$$

On convertit en TeV

$$E_{\text{collision}} = \frac{2,2406522 \times 10^{-6}}{1,60 \times 10^{-19} \times 10^{12}} = 14,0 \text{ TeV}$$

Cette méthode donne bien le résultat avec trois chiffres significatifs comme le sujet le demande.

3.2. Chaque proton possède une énergie totale de 7,00 TeV.

Il circule 2808 paquets contenant chacun 110 milliards de protons.

L'énergie cinétique de l'ensemble des protons vaut : $7,00 \times 2808 \times 110 \times 10^9 = 2,16 \times 10^{15} \text{ TeV}$

On convertit cette énergie en joules : $1 \text{ TeV} = 10^{12} \text{ eV} = 10^{12} \times 1,60 \times 10^{-19} = 1,60 \times 10^{-7} \text{ J}$

L'ensemble des protons ont une énergie de $2,16 \times 10^{15} \times 1,60 \times 10^{-7} = 3,46 \times 10^8 \text{ J}$, soit un ordre de grandeur de 10^8 J .

Énergie cinétique d'une rame de TGV lancée à pleine vitesse, supposons $v = 200 \text{ km.h}^{-1} = 55,6 \text{ m/s}$

$$E_{TGV} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} 444.10^3 (55,6)^2 = 6,86.10^8 \text{ J}$$

On obtient des énergies du même ordre de grandeur.

4. Quelle durée de vie au LHC ?

4.1. La durée de vie propre du méson est définie dans le référentiel propre. Donc dans le référentiel où les deux événements « naissance » et « mort » ont lieu au même endroit, c'est-à-dire dans le référentiel {méson}.

4.2. Dans le référentiel du laboratoire le méson parcourt la distance d avec une vitesse pratiquement égale à c .

$$\text{donc } \Delta T = \frac{d}{c} = \frac{1,0.10^{-2}}{299792458} = 3,3.10^{-11} \text{ s}$$

On trouve ΔT très supérieur à ΔT_0 , ce qui montre que la vitesse du proton s'approche de celle de la lumière. On peut vérifier en calculant la valeur de $\gamma = 22$ qui correspond largement à des particules relativistes.

On vérifie que $\frac{v}{c} = 0,9989$ donc proche de c

Exploitation de document
uniquement

Ne pas oublier l'aller-retour ...

La précision est due au fait que
l'incertitude est liée au pixel...

EXERCICE 3 : Etude d'un sondeur

1. Le sondeur doit comporter un capteur de température car la célérité de l'onde ultrasonore qu'il émet dépend (entre autres) de la température. Une erreur sur la vitesse du son va entraîner une erreur sur la distance donc sur la localisation du poisson.
Pour une température de 10°C et une salinité de 35‰ , on lit sur le document 1 : $v=1490\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

2. L'article de « Pour la science » indique que la réflexion dépend de la taille du réflecteur (poisson) face à la longueur d'onde de l'onde incidente. Déterminons cette longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1490}{83 \cdot 10^3} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ Hz} = 1,8 \text{ cm}$$

Les sardines tout comme les thons sont grands par rapport à cette longueur d'onde, donc la réflexion des ondes ultrasonores sera directionnelle et le sondeur pourra les détecter.

3. L'onde effectue un aller-retour, soit une distance égale à $2d$, en une durée Δt donc

$$d = \frac{v \times \Delta t}{2} = \frac{1490 \times 32 \cdot 10^{-3}}{2} = 24 \text{ m}$$

4. La distance D parcourue par l'onde est plus élevée à l'entrée et à la sortie du cône (voir schéma $D > d$). Or le sujet indique que sur l'écran, les dimensions mesurées verticalement sont proportionnelles aux distances et que le haut de l'écran correspond à la surface de l'eau (profondeur nulle).

D'où l'allure en « accent circonflexe ».

5. Le document nous indique qu'il y a 160 pixels verticaux avec une incertitude de 1 pixel.

Pour la plage 0 à 50 m, un pixel correspond à $\frac{1 \times 50}{160} = 0,31 \text{ m}$

Pour la plage de 0 à 100 m l'incertitude d'un pixel correspond à 0,62m

D'après la question 3, le poisson se situe à 24 m de profondeur donc la meilleure plage de mesure est celle allant de 0 à 50 m de profondeur.

6. La relation donnant le décalage en fréquence dû à l'effet Doppler est :

$$|\Delta f| = \frac{2v \cos \alpha}{c} \text{ donc } v = \frac{|\Delta f| \times c}{2f \cos \alpha}$$

L'angle α varie au cours du déplacement du poisson. Sa valeur n'est connue qu'à l'entrée et à la sortie du cône de détection car on suppose que le constructeur fournit cette donnée au calculateur intégré au sondeur.

D'après le site www.carnassiers.com

Finalement :

La vitesse de déplacement du poisson ne peut être évaluée qu'aux instants t_1 et t_3 et il est impossible de déterminer v à t_2 car $\alpha = 90^{\circ}$ et donc $\cos \alpha = 0$.